



"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 1 ó 2 VASOS,

Mas implantación de stent coronario.

Es un procedimiento en el cual se inserta en la arteria coronaria un catéter especial con un pequeño balón que se infla para ensanchar la arteria o proceder a la colocación de un stent (pequeño tubo de malla de alambre flexible) que proporciona soporte a la arteria y permite mantenerla abierta de forma permanente y mejorar así el flujo sanguíneo.

Instrucciones antes del procedimiento:

- **Ayuno** mínimo de 6 hora (ayuno incluye no consumir ningún tipo de alimento inclusive agua)
- Baño general. Debe venir con ropa cómoda, sin joyas ni accesorios .
- Traer utensilios de aseo personal (cepillo de dientes, toalla) porque después de la realización de la angioplastia coronaria o de la colocación de un stent, deberá **pasar la noche en la clínica**, para vigilarlo durante un período aproximado de 24 horas.
- Debe rasurarse la región inguinal en ambos lados. Uñas sin maquillaje.
- Si consume o se le aplican **medicamentos antiagregantes y/o anticoagulantes** como: warfarina (coumadin), heparina, enoxaparina (fraxiparina), dalteparina (fragmin) debe suspenderlo 3 antes del procedimiento previa autorización del médico tratante.
- Traer historia clínica si se tiene, **resultados de pruebas de coagulación** como INR, TP, TPT, Plaquetas, Hemoglobina y Hematocrito, creatinina, realizados en la misma semana del examen (estos son exámenes de laboratorio clínico) y con valores normales y resultados de **estudios de imágenes** de cardiología anteriores (EKG, CATETERISMO, ECOCARDIOGRAMAS, Y CD o película del examen, ecografías, Rx, tomografías, resonancias magnéticas). Si le han realizado cirugía de **BY-PASS**, debe trae el informe.
- Tomar medicamentos para la presión con poca agua en caso de que el paciente lo requiera.
- En caso de que el paciente sea diabético no tomar la medicación de la diabetes el día del examen en la mañana ni aplicar insulina el día del procedimiento. Si toma metformina (hipoglicemiante), suspenderla 3 días antes al procedimiento.
- Debe tomar líquidos abundantes (agua) el día previo al procedimiento.
- Debe venir con un acompañante con capacidad para tomar decisiones y presentarse media hora antes de la hora asignada para el procedimiento para realizar el proceso de admisión.
- Al alta, el paciente debe ser transportado en AMBULANCIA.

Instrucciones después del procedimiento:

- Guardar reposo el día del examen (24 horas siguientes al procedimiento)
- No doblar la extremidad (pierna o brazo) por la cual se le realizó el procedimiento, durante las primeras 24 horas.
- Tomar los medicamentos siguiendo las indicaciones del médico.
- No aplicar en el sitio de la inserción cremas, hielo o paños de agua caliente, ya que estos pueden provocar sangrado grave.
- Si la inserción se hizo en la ingle, dúchese o lávese con una esponja durante algunos días, pero no se sumerja en la bañera ni practique la natación.
- No levante pesos de más de 10 libras antes de 3 días después de haberle realizado el procedimiento.

Signos y síntomas de alarma:

- Usted deberá consultar por el servicio de urgencias de si nota algún cambio durante la semana siguiente al procedimiento: el punto de la inserción produce cada vez más dolor, hinchazón, enrojecimiento, sangrado, calor, fiebre, dolor en el pecho, incapacidad de orinar o sangre en la orina, dolor intenso o sensación de frío o un color azulado en la pierna o el brazo en el que le insertaron el catéter.

Recuerde!

La fecha y hora de su cita es:

Día

Mes

Año

Sede: _____ Bloque: _____ Piso: _____ Consultorio: _____ Hora: _____



Para mayor información, comuníquese con nosotros

al teléfono: _____ extensión: _____