



"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

Biopsia de Mama por aspiración con Aguja Fina (B.A.C.A.F)

Una Biopsia por aspiración es: Un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra de líquido para examinar la citología del material obtenido al microscopio

Instrucciones antes del procedimiento:

- ❶ No requiere ayuno, de esta manera el usuario puede consumir su alimentación de manera habitual.
- ❶ Sí el paciente se aplica insulina, el día del examen No se la debe suministrar
- ❶ Si consume **ASA, ASPIRINA o ASAWIN**, debe suspenderlos 8 días antes del examen.
- ❶ Si consume o se le aplican **medicamentos antiagregantes y/o anticoagulantes** como: Clopidogrel (plavix, Iscover), Warfarina (coumadin), heparina, enoxaparina (fraxiparina), dalteparina (fragmin) debe suspenderlo antes del procedimiento previa autorización del médico tratante.
- ❶ Realizarse pruebas de coagulación TP, TPT, Plaquetas, Hemoglobina y Hematocrito en la misma semana del examen. (estos son exámenes de laboratorio clínico indispensables para el procedimiento). Deben tener valores normales.
- ❶ Traer resultados de estudios de imágenes anteriores, si se las ha hecho (ecografías, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas). **Indispensables**
- ❶ Traer historia clínica anterior si se tiene.
- ❶ Debe llegar con acompañante con capacidad de decisión y presentarse media hora antes de la hora asignada para su cita para realizar el proceso de admisión.
- ❶ Baño general. Debe venir con ropa cómoda, sin accesorios ni joyas u objetos de valor.
- ❶ Sí el paciente es hipertenso, NO suspender el medicamento de la hipertensión y realizarse control una semana antes del procedimiento en su centro de atención.

Instrucciones después del procedimiento:

- ❶ Seguir fórmula médica de analgésicos orales, antiinflamatorios y antibióticos.
- ❶ Colocar hielo local en forma intermitente, No masajear el seno.
- ❶ Tener reposo relativo, lo que implica no realizar actividades físicas pesadas ni movimientos bruscos.
- ❶ Evite levantar elementos pesados.
- ❶ Aplicación de vendaje compresivo según indicaciones médicas.
- ❶ Curación a necesidad de acuerdo a criterio médico.
- ❶ Después del procedimiento puede seguir con su medicación habitual, los medicamentos anticoagulantes se deben reiniciar según orden médica.

Signos y síntomas de alarma:

- ❶ En caso de sangrado abundante, abultamiento y dolor, palidez, sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, o salida de material purulento o sangrado abundante por la zona intervenida, o dificultad respiratoria debe consultar por urgencias.

Recuerde!

La fecha y hora de su cita es:

Día

Mes

Año

Sede: _____ Bloque: _____ Piso: _____ Consultorio: _____ Hora: _____



Para mayor información, comuníquese con nosotros

al teléfono: _____ extensión: _____