



"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

Venografía o Flebografía (embolización)

Flebografía o Venografía: Es una exploración diagnóstica invasiva que permite el estudio de la circulación venosa de las extremidades inferiores, en donde se aplica un medio de contraste para ser visualizadas.

Instrucciones antes del procedimiento:

- ❶ Debe asistir con un acompañante con capacidad de decisión.
- ❶ Debe traer toda la documentación de identidad, historia clínica relacionada con el procedimiento que se le realizará y fórmula médica de medicamentos que se administra.
- ❶ Debe realizarse baño general y venir con ropa cómoda, sin accesorios ni joyas u objetos de valor.
- ❶ Ingles rasuradas, uñas sin esmalte
- ❶ Debe presentarse 1 hora antes de la hora programada para el procedimiento, con el fin de realizar el proceso de admisión.
- ❶ Requiere un ayuno de mínimo 8 horas (ayuno implica no consumir ningún tipo de alimentos incluso agua). En caso de que sea en horas de la tarde el paciente debe estar sin almorzar.
- ❶ Debe tener resultados de laboratorio de la misma semana, pruebas de coagulación, recuento de plaquetas y creatinina.
- ❶ En caso de que el paciente sea diabético suspender medicamentos 12 horas antes medicamentos como metformina y reiniciar 48 horas después, continuar con insulina si el paciente lo requiere según orden medica.
- ❶ Si el paciente toma antihipertensivos no suspenderlos para el procedimiento.
- ❶ En caso de estar recibiendo cualquier tipo de anticoagulante suspenderlo 8 días antes del procedimiento previa aprobación de medico tratante (ASA, Clopidogrel, warfarina)
- ❶ Debe tener tenga valoración médica y no tener ninguna contraindicación para la el procedimiento.

- ❶ Para procedimientos que requieran anestesia general: Debe tener evaluación por anestesiólogo previo, al procedimiento.
- ❶ Debe cumplir con las recomendaciones que le brinde el personal del servicio de radiología intervencionista de nuestra institución.

Instrucciones después del procedimiento:

- ❶ Vigilar la presencia de sangrado, hematoma (hinchazón del sitio), equimosis (morado), salida de material purulento. Del sitio de punción.
- ❶ Reposos absoluto por 4 horas y relativo por 12 horas.
- ❶ Puede presentar fiebre, Dolor intenso, Frialdad y cianosis (color morado o blanco) de la extremidad por donde se hizo el estudio.
- ❶ Retirar apósito 6 horas después.

Signos y síntomas de alarma:

- ❶ Si Presenta sangrado, salida de material purulento por el sitio de punción, Dolor intenso, Fiebre y escalofrío, frialdad en la extremidad puncionada, debe consultar por el servicio de urgencias.

Recuerde!

La fecha y hora de su cita es:

Día

Mes

Año

Sede: _____ Bloque: _____ Piso: _____ Consultorio: _____ Hora: _____



Para mayor información, comuníquese con nosotros

al teléfono: _____ extensión: _____