



"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

Realización y Cuidados de

Arteriografías y/o angioplastias

La Angioplastia es: Un procedimiento que se efectúa la dilatación de una estructura vascular generalmente utilizando un balón inflable dentro de su luz.

Instrucciones antes del procedimiento :

- ❶ Debe asistir con un acompañante con capacidad de decisión.
- ❶ Debe traer toda la documentación de identidad, historia clínica relacionada con el procedimiento que se le realizará y formula medica de medicamentos que se administra.
- ❶ Debe realizarse baño general. Debe venir con ropa cómoda, sin accesorios ni joyas u objetos de valor.
- ❶ Ingles rasuradas, uñas sin esmalte.
- ❶ Debe presentarse 1 hora antes de la hora programada para el procedimiento, con el fin de realizar el proceso de admisión.
- ❶ Requiere un ayuno de mínimo 8 horas (ayuno implica no consumir ningún tipo de alimentos incluso agua). En caso de que sea en horas de la tarde el paciente debe estar sin almorzar.
- ❶ Resultados de laboratorio de la misma semana pruebas de coagulación y recuento de plaquetas y creatinina.
- ❶ En caso de que el paciente sea diabético suspender medicamentos 12 horas antes medicamentos como metformina y reiniciar 48 horas después, continuar con insulina si el paciente lo requiere según orden medica.
- ❶ Si el paciente toma antihipertensivos no suspenderlos para el procedimiento.
- ❶ En caso de estar recibiendo cualquier tipo de anticoagulante suspenderlo 8 días antes del procedimiento previa aprobación de medico tratante (ASA, Clopidogrel, warfarina)
- ❶ Verificar que el paciente tenga valoración médica y no tenga ninguna contraindicación para la el procedimiento.

- ❶ Debe cumplir con las recomendaciones que le brinde el personal del servicio de radiología intervencionista de nuestra institución.
- ❶ Procedimientos que requieran anestesia general: Evaluación por anestesiólogo previo al procedimiento.

Instrucciones después del procedimiento:

- ❶ Vigilar la presencia de sangrado, hematoma (hinchazón del sitio), equimosis (morado), salida de material purulento. Del sitio de punción.
- ❶ Reposos absoluto por 12 horas y relativo por 24 horas.
- ❶ Puede presentar fiebre, Dolor intenso, Frialdad y cianosis (color morado o blanco) de la extremidad por donde se hizo el estudio.
- ❶ Retirar apósito 12 horas después.

Signos y síntomas de alarma:

- ❶ Si Presenta sangrado, salida de material purulento por el sitio de punción, Dolor intenso, Fiebre y escalofrío, frialdad en la extremidad puncionada, debe consultar por el servicio de urgencias

Recuerde!

La fecha y hora de su cita es:

Día

Mes

Año

Sede: _____ Bloque: _____ Piso: _____ Consultorio: _____ Hora: _____



Para mayor información, comuníquese con nosotros
al teléfono: _____ extensión: _____